


ПАМЯТКА для охотников по профилактике и недопущению распространения птичьего гриппа в период весенне-осенней охоты

- ☞ Не проводить охоту на водоемах, где наблюдается массовая гибель птицы.
- ☞ При выявлении павшей дичи сообщать в ветеринарную службу района.
- ☞ Проводить отстрел только здоровой птицы.
- ☞ Потрошение убитой дичи проводить не позднее 2-х часов после отстрела, пух, перо и внутренние органы сжигать на месте, при обнаружении несвойственных изменений внутренних органов, тушки сжигать целиком.
- ☞ Тушки обработанной и потрошенной птицы упаковывать в непроницаемую тару (полиэтиленовые мешки, эмалированную посуду).



☞ Мясо отстрелянной птицы использовать для питания после тщательной проварки.

- ☞ Категорически запрещается скармливание внутренних органов и отходов свиньями, домашним и диким птицам.
- ☞ Исключить приготовление мяса отстрелянной птицы путем копчения.

При контакте с дикой птицей соблюдать правила личной гигиены:

- мыть руки с мылом, своевременно обрабатывать раны и ссадины йодом или бриллиантовой зеленью, при необходимости обратиться к врачу

ГРИПП ПТИЦ

Управление ветеринарии Тюменской области сообщает о выявлении гриппа А птиц подтипа Н5 в ООО «Птицефабрика Маркинская» (хутор Маркина, Октябрьского района, Ростовской области).

В связи с неоднократной регистрацией вспышек гриппа птиц на европейской территории Российской Федерации создается угроза заноса возбудителя вируса гриппа А птиц на территорию субъектов Российской Федерации.

Полагаем, что особенно высок риск заноса этого вируса в Новосибирскую, Томскую, Омскую, Курганскую области, в Алтайский край и на север Якутии.

Грипп птиц – высоко заразная вирусная инфекция, которая может поражать все виды птиц независимо от возраста. Наиболее чувствительными из домашних видов являются индюки и куры.

Течение болезни молниеносное, острое и подострое. Гибель птицы наступает через 1-3 дня. Источником инфекции являются больная и переболевшая птица, факторы передачи: корм, вода, предметы ухода, речная и озерная растительность, контакт домашней птицы с дикой водоплавающей.

Симптомы заболевания: общее состояние угнетенное, больная птица сидит неподвижно, нахохлившись, опустив крылья и голову, дыхание хриплое, учащенное, истечение из носа, глаз, отмечается нарушение координации движения, вращательные движения головой, искривление шеи, судороги, посинение, опухание и почернение гребня, сережек и конечностей.

Владельцам домашней птицы в целях недопущения и профилактики данного заболевания:

1. Запрещается свободновыгульное содержание птицы во избежание контакта с дикой водоплавающей птицей.
2. Исключить из рациона птиц рыбу, озерную и речную растительность (ряску).
3. Не допускать контакта с птицей соседних и других подворий.
4. Обеспечить изолированное содержание домашней птицы в подворьях.
5. Категорически запрещено выбрасывать трупы птиц и сжигать самостоятельно.
6. Беспрепятственно предоставлять птицу для профилактической вакцинации и диагностических исследований.

При возникновении вышеуказанных симптомов и падежа птицы в личных подворьях граждан немедленно сообщать в ГАУ ТО «Ишимский ветцентр» (тел. 7-36-62, 7-15-88).